

Guía de inicio con la inyección de ZILBRYSQ® (zilucoplan) para administración subcutánea

Consulte la información de seguridad importante sobre ZILBRYSQ al final de este documento.

ONWARD™ se brinda como un servicio de UCB y tiene como objetivo apoyar el uso adecuado de los medicamentos de UCB.

ONWARD se puede modificar o cancelar en cualquier momento sin previo aviso. Es posible que se apliquen algunas restricciones al programa y a la elegibilidad.

ZILBRYSQ® es una marca registrada y ONWARD™ es una marca comercial del grupo UCB.

Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

©2024 UCB, Inc., Smyrna, GA 30080. Todos los derechos reservados. US-ZL-2400123

Guía de inicio

con la inyección de ZILBRYSQ® (zilucoplan)
para administración subcutánea

ZILBRYSQ®
(zilucoplan) – Inyección



PRIMEROS PASOS:

Añada la información de contacto de su coordinador de cuidados de ONWARD™ (OCC) a los contactos de su teléfono celular para mantenerse en contacto.

Programe una llamada con su OCC para conocer la cobertura de su seguro y los posibles criterios de elegibilidad para recibir ayuda económica.

Asegúrese de tener un plan con su proveedor de atención médica para recibir todas las vacunas necesarias para reforzar el comienzo del tratamiento con ZILBRYSQ. La farmacia especializada no puede realizar envíos hasta que usted los haya recibido.

Revise su kit de demostración del dispositivo.

Si su proveedor de atención médica no le ha ofrecido un kit de demostración del dispositivo, póngase en contacto con nosotros y se lo enviaremos a su domicilio.

PREPARACIÓN DE LA PRIMERA INYECCIÓN:

Una vez confirmados los beneficios del seguro, se procesará y se le enviará su pedido de ZILBRYSQ a través de la farmacia especializada, PANTHERx Rare. Espere una llamada telefónica del 833-418-7760 para coordinar la entrega.

Coordine la entrega con la farmacia especializada. **Recuerde que tendrá que hablar por teléfono con un representante de la farmacia.**

Programe un curso de actualización sobre inyecciones con su OCC, si es necesario.

Invite a un cuidador para que le ayude.

Solicite un kit de demostración del dispositivo.

Consulte la información de seguridad importante sobre ZILBRYSQ en la página 3.

Continuación ↓

Guía de inicio

con la inyección de ZILBRYSQ® (zilucoplan)
para administración subcutánea

ZILBRYSQ®
(zilucoplan) – Inyección



Establezca el lugar de la inyección:

Busque un lugar limpio y tranquilo.

Prepare ZILBRYSQ con antelación, especialmente si lo ha almacenado en el refrigerador. Debe estar a temperatura ambiente.

Reúna los materiales que necesite, como bolitas de algodón, toallitas con alcohol, vendas adhesivas y un recipiente para desechar objetos punzantes o resistentes a los pinchazos para desecharlos de forma fácil y adecuada.

Considere la posibilidad de añadir elementos que le hagan sentirse a gusto, como música o aromaterapia.

DESPUÉS DEL PRIMER TRATAMIENTO:

Revise cómo ha ido el proceso de inyección y piense si hay algún cambio que quiera hacer para la próxima inyección.

Póngase en contacto con su proveedor de atención médica ante cualquier pregunta o duda relacionada con su tratamiento.



Su OCC se pondrá en contacto con usted durante el tratamiento para comprobar cómo le va y siempre estará dispuesto a escuchar si quiere contarle cómo le está yendo.

Consulte la información de seguridad importante sobre ZILBRYSQ en la siguiente página.

Continuación 

Guía de inicio

con la inyección de ZILBRYSQ® (zilucoplan) para administración subcutánea

ZILBRYSQ®
(zilucoplan) – Inyección



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE, INCLUIDA LA ADVERTENCIA EN EL RECUADRO

ZILBRYSQ es un medicamento que afecta su sistema inmunitario. ZILBRYSQ puede disminuir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir ciertas infecciones. ZILBRYSQ aumenta la probabilidad de contraer infecciones meningocócicas serias y potencialmente mortales. Las infecciones meningocócicas pueden llegar a ser potencialmente mortales si no se detectan y tratan a tiempo. Debe completar o actualizar dos tipos de vacunas antimeningocócicas (tanto para las infecciones por el serogrupo B como para las infecciones por los serogrupos A, C, W e Y) al menos 2 semanas antes de su primera dosis de ZILBRYSQ si aún no se ha puesto estas vacunas. Si su proveedor de atención médica decidiera que es necesario un tratamiento urgente con ZILBRYSQ, deberá recibir las vacunas antimeningocócicas lo antes posible. Si no ha completado o actualizado las vacunas contra las infecciones meningocócicas al menos 2 semanas antes de su primera dosis de ZILBRYSQ y el tratamiento con ZILBRYSQ debe iniciarse de inmediato, también debe recibir antibióticos. Si se le administró una vacuna meningocócica en el pasado, es posible que necesite una vacuna adicional antes de empezar el tratamiento con ZILBRYSQ. Su proveedor de atención médica decidirá si necesita una vacunación antimeningocócica adicional. Las vacunas antimeningocócicas no previenen todas las infecciones meningocócicas. **Llame a su proveedor de atención médica o solicite atención médica de urgencia inmediatamente si presenta alguno de estos signos y síntomas de una infección meningocócica:** dolor de cabeza con náuseas o vómitos, dolor de cabeza y fiebre, dolor de cabeza con rigidez de cuello o espalda, fiebre, fiebre y erupción cutánea, confusión, dolores musculares con síntomas gripales y ojos sensibles a la luz.

Su proveedor de atención médica le dará una tarjeta de seguridad para el paciente sobre el riesgo de infección meningocócica. Llévela consigo en todo momento durante el tratamiento y durante los 2 meses siguientes a la última dosis de ZILBRYSQ. El riesgo de infección meningocócica puede continuar durante varias semanas después de la última dosis de ZILBRYSQ. Es importante que muestre esta tarjeta a cualquier proveedor de atención médica que le atienda. Esto lo ayudará a diagnosticarlo y tratarlo rápidamente. **ZILBRYSQ solo se encuentra disponible mediante un programa llamado ZILBRYSQ REMS.** Antes de que pueda recibir ZILBRYSQ, su proveedor de atención médica debe: inscribirse en el programa REMS de ZILBRYSQ; asesorarle sobre el riesgo de infección meningocócica; entregarle la guía del paciente, que incluye información sobre los signos y síntomas de la infección meningocócica; entregarle una **tarjeta de seguridad del paciente** sobre su riesgo de infección meningocócica, como se ha comentado anteriormente; asegurarse de estar vacunado con dos tipos de vacunas antimeningocócicas y, si es necesario, vacunarse nuevamente con las vacunas antimeningocócicas. Pregunte a su proveedor de atención médica si no está seguro sobre si necesita volver a vacunarse.

ZILBRYSQ también puede aumentar el riesgo de otros tipos de infecciones serias. ZILBRYSQ puede aumentar la probabilidad de contraer *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae* tipo b. Su proveedor de atención médica le indicará si debe recibir las vacunas contra *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae* tipo b. Ciertas personas pueden tener un mayor riesgo de infección por gonorrea. Hable con su proveedor de atención médica sobre el riesgo de infección por gonorrea, sobre la prevención de la gonorrea y sobre las pruebas periódicas. Llame inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta nuevos signos o síntomas de infección.

No utilice ZILBRYSQ si usted tiene una infección por *Neisseria meningitidis*.

Antes de utilizar ZILBRYSQ, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus patologías, incluso si usted tiene una infección o fiebre; si está embarazada o planea embarzarse; o si está amamantando o planea amamantar. **Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos de venta libre y con receta, las vitaminas y los productos herbarios.

Además de aumentar las probabilidades de contraer infecciones meningocócicas serias, ZILBRYSQ también puede causar inflamación del páncreas (pancreatitis) y otros problemas pancreáticos. Se han dado casos de pancreatitis y quistes pancreáticos en personas que utilizan ZILBRYSQ. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para controlar su páncreas antes de iniciar el tratamiento con ZILBRYSQ. **Llame inmediatamente a su proveedor de atención médica** si tiene dolor en la zona del estómago (abdomen) que no desaparece. Su proveedor de atención médica le indicará si debe dejar de utilizar ZILBRYSQ. El dolor puede ser severo o sentirse desde el abdomen hasta la espalda. El dolor puede aparecer con o sin vómitos. Estos pueden ser síntomas de pancreatitis.

Los efectos secundarios más frecuentes de ZILBRYSQ incluyen reacciones en el lugar de la inyección, infecciones de las vías respiratorias superiores y diarrea.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ZILBRYSQ. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA en www.fda.gov/medwatch o al 1-800-FDA-1088. También puede informar de los efectos secundarios a UCB, Inc. llamando al 1-844-599-CARE [2273].

Consulte las instrucciones de uso detalladas que se incluyen con ZILBRYSQ para obtener información sobre cómo preparar e inyectar una dosis de ZILBRYSQ y cómo descartar (desechar) correctamente las jeringas precargadas y utilizadas de ZILBRYSQ.

ZILBRYSQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos que tienen una enfermedad denominada miastenia grave (gMG) con presencia de anticuerpos positivos para el antirreceptor de acetilcolina (AChR). Se desconoce si ZILBRYSQ es seguro y efectivo en niños.

Consulte la información de prescripción completa y la guía del medicamento de ZILBRYSQ, incluido el recuadro de advertencia relativo a las infecciones meningocócicas serias. Consulte las instrucciones de uso de la jeringa precargada de dosis única de ZILBRYSQ. Hable con su proveedor de atención médica sobre su enfermedad o su tratamiento. Para obtener más información, ingrese en www.ZILBRYSQ.com o llame al 1-844-599-2273.