

Guía de inicio con la inyección de ZILBRYSQ® (zilucoplan) para administración subcutánea

Consulte la información de seguridad importante sobre ZILBRYSQ al final de este documento.

ONWARD® se brinda como un servicio de UCB y tiene como objetivo apoyar el uso adecuado de los medicamentos de UCB.

ONWARD se puede modificar o cancelar en cualquier momento sin previo aviso. Es posible que se apliquen algunas restricciones al programa y a la elegibilidad.

ZILBRYSQ®, ONWARD® y UCBCares® son marcas comerciales registradas del Grupo de Empresas UCB.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

©2026 UCB, Inc., Smyrna, GA 30080. Todos los derechos reservados. US-ZL-2600087

Guía de inicio

con la inyección de ZILBRYSQ® (zilucoplan) para administración subcutánea

ZILBRYSQ®
(zilucoplan) Inyección
16,6 mg/0,416 mL • 23 mg/0,574 mL • 32,4 mg/0,81 mL



PRIMEROS PASOS:

Asegúrese de tener un plan con su proveedor de atención médica para recibir todas las vacunas necesarias para reforzar el comienzo del tratamiento con ZILBRYSQ. La farmacia especializada no puede realizar envíos hasta que usted los haya recibido.

Confirme y comprenda los gastos de bolsillo en los que podría incurrir con su farmacia especializada. Si corresponde, presente su tarjeta de copago o información de ayuda financiera a su farmacia especializada.

Revise su kit de demostración del dispositivo.

Si su proveedor de atención médica no le ha ofrecido un kit de demostración del dispositivo, póngase en contacto con nosotros y se lo enviaremos a su domicilio.

PREPARACIÓN DE LA PRIMERA INYECCIÓN:

Una vez confirmados los beneficios del seguro, se procesará y se le enviará su pedido de ZILBRYSQ a través de la farmacia especializada, PANTHERx Rare. Espere una llamada telefónica del 833-418-7760 para coordinar la entrega.

Coordine la entrega con la farmacia especializada. **Recuerde que tendrá que hablar por teléfono con un representante de la farmacia.**

Cuando hable con la farmacia para coordinar su primer pedido, revise la información de almacenamiento del producto. **Continuación** ↓

Consulte la información de seguridad importante sobre ZILBRYSQ en la página 3.

Guía de inicio

con la inyección de ZILBRYSQ® (zilucoplan) para administración subcutánea

ZILBRYSQ®
(zilucoplan) Inyección
16,6 mg/0,416 mL • 23 mg/0,574 mL • 32,4 mg/0,81 mL



Programe un curso de actualización sobre inyecciones con su OCC, si es necesario.

Invite a un cuidador para que le ayude.

Tómese un tiempo para explorar su kit de bienvenida ONWARD, que se incluye en su primer pedido.

Establezca el lugar de la inyección:

Busque un lugar limpio y tranquilo.

Prepare ZILBRYSQ con antelación, especialmente si lo ha almacenado en el refrigerador. Debe estar a temperatura ambiente durante 30 a 45 minutos (sin que le llegue luz del sol directa).

Reúna los materiales que necesite, como bolitas de algodón, toallitas con alcohol, vendas adhesivas y un recipiente para desechar objetos punzantes o resistentes a los pinchazos para desecharlos de forma fácil y adecuada.

Considere la posibilidad de incluir elementos que le hagan sentirse a gusto, como música o aromaterapia.

DESPUÉS DE SU PRIMER TRATAMIENTO:

Revise cómo ha ido el proceso de inyección y piense si hay algún cambio que quiera hacer para la próxima inyección.

Póngase en contacto con su proveedor de atención médica ante cualquier pregunta o duda relacionada con su tratamiento.



Su OCC se pondrá en contacto con usted durante el tratamiento para comprobar cómo le va y siempre estará dispuesto a escuchar si quiere contarle cómo le está yendo.

Consulte la información de seguridad importante sobre ZILBRYSQ en la siguiente página.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE, INCLUIDO EL RECUADRO DE ADVERTENCIA E INDICACIONES

ZILBRYSQ es un medicamento que afecta parte de su sistema inmunitario. ZILBRYSQ puede disminuir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. ZILBRYSQ aumenta su probabilidad de contraer infecciones meningocócicas graves causadas por la bacteria *Neisseria meningitidis*. Si no se identifican y tratan a tiempo, las infecciones meningocócicas podrían convertirse rápidamente en potencialmente mortales o causar la muerte. Debe completar o actualizar su(s) vacuna(s) antimeningocócica(s) al menos 2 semanas antes de la primera dosis de ZILBRYSQ. Si no ha completado sus vacunas antimeningocócicas y debe iniciar el tratamiento con ZILBRYSQ de inmediato, debe recibir las vacunas requeridas lo antes posible. Si no se ha vacunado y debe iniciar el tratamiento con ZILBRYSQ de inmediato, también debe recibir antibióticos durante el tiempo que le indique su proveedor de atención médica. Si se le ha administrado una vacuna meningocócica en el pasado, es posible que necesite vacunas adicionales antes de iniciar el tratamiento con ZILBRYSQ. Su proveedor de atención médica decidirá si necesita vacunas antimeningocócicas adicionales. Las vacunas antimeningocócicas no previenen todas las infecciones meningocócicas. **Llame a su**

proveedor de atención médica o solicite atención médica de urgencia de inmediato si presenta alguno de estos signos y síntomas de una infección meningocócica: fiebre, fiebre y erupción, fiebre con frecuencia cardíaca alta, dolor de cabeza con náuseas o vómitos, dolor de cabeza y fiebre, dolor de cabeza con rigidez de cuello o espalda, confusión, ojos sensibles a la luz y dolores musculares con síntomas gripales.

Su proveedor de atención médica le dará una Tarjeta de Seguridad del Paciente sobre el riesgo de contraer una infección meningocócica seria. Llévela consigo en todo momento durante el tratamiento y durante los 2 meses siguientes a la última dosis de ZILBRYSQ. Su riesgo de infección meningocócica puede continuar durante varias semanas después de la última dosis de ZILBRYSQ. Es importante que muestre esta tarjeta a cualquier profesional de la salud que le atienda. Esto lo ayudará a diagnosticarlo y tratarlo rápidamente. **ZILBRYSQ solo está disponible a través de un programa llamado ZILBRYSQ Estrategia de Evaluación y Mitigación del Riesgo (REMS).** Antes de que pueda recibir ZILBRYSQ, su proveedor de atención

Guía de inicio con la inyección de ZILBRYSQ® (zilucoplan) para administración subcutánea

ZILBRYSQ®
(zilucoplan) Inyección
16,6 mg/0,416 mL • 23 mg/0,574 mL • 32,4 mg/0,81 mL



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE, INCLUIDO EL RECUADRO DE ADVERTENCIA E INDICACIONES (cont.)

médica debe: inscribirse en el programa ZILBRYSQ REMS; orientarlo con respecto al riesgo de contraer infecciones meningocócicas; entregarle la Guía del Paciente, que incluye información sobre los signos y síntomas de una infección meningocócica; entregarle una **Tarjeta de Seguridad del Paciente** sobre su riesgo de contraer una infección meningocócica, según se ha comentado anteriormente; asegurarse de que sea vacunado contra infecciones graves causadas por bacterias meningocócicas y de que reciba antibióticos si necesita iniciar el tratamiento con ZILBRYSQ de inmediato y no tiene sus vacunas al día.

ZILBRYSQ también puede aumentar el riesgo de contraer otros tipos de infecciones serias causadas por bacterias encapsuladas, incluidas *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y *Neisseria gonorrhoeae*. Algunas personas podrían estar en riesgo de contraer infecciones serias con gonorrea. Hable con su proveedor de atención médica sobre si presenta riesgo de infección por gonorrea, sobre cómo prevenir la gonorrea y sobre los exámenes periódicos. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta nuevos signos o síntomas de infección.

No use ZILBRYSQ si tiene una infección meningocócica seria cuando inicie el tratamiento con ZILBRYSQ.

Antes de usar ZILBRYSQ, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si tiene una infección o fiebre; si está embarazada o planea embarazarse; o si está amamantando o planea amamantar. Existe un registro de embarazo para mujeres que usan ZILBRYSQ durante el embarazo. El propósito de este registro es recopilar información sobre su salud y la salud de su bebé. Si queda embarazada mientras toma ZILBRYSQ, usted o su proveedor de atención médica pueden comunicarse con UCBCares® al 1-844-599-CARE (2273) o enviar un correo electrónico a ucbcares@ucb.com para inscribirse u obtener más información sobre el registro. **Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Además de aumentar las probabilidades de contraer infecciones meningocócicas graves, ZILBRYSQ también puede causar inflamación del páncreas (pancreatitis) y otros problemas pancreáticos.

Guía de inicio con la inyección de ZILBRYSQ® (zilucoplan) para administración subcutánea

ZILBRYSQ®
(zilucoplan) Inyección
16,6 mg/0,416 mL • 23 mg/0,574 mL • 32,4 mg/0,81 mL



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE, INCLUIDO EL RECUADRO DE ADVERTENCIA E INDICACIONES (cont.)

Se han dado casos de pancreatitis y quistes pancreáticos en personas que utilizan ZILBRYSQ. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para controlar su páncreas antes de iniciar el tratamiento con ZILBRYSQ.

Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si sufre dolor que no desaparece en el área del estómago (abdomen). Su proveedor de atención médica le indicará si debe suspender el tratamiento con ZILBRYSQ. El dolor puede ser severo o sentirse desde el abdomen hasta la espalda. El dolor puede aparecer con o sin vómitos. Estos pueden ser síntomas de pancreatitis.

Entre los efectos secundarios más comunes de ZILBRYSQ, se encuentran las reacciones en el lugar de la inyección, las infecciones del tracto respiratorio superior y la diarrea.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ZILBRYSQ. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA en

www.fda.gov/medwatch o al 1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios a UCB, Inc. llamando al 1-844-599-CARE [2273].

Consulte las Instrucciones de Uso detalladas que se incluyen con ZILBRYSQ para obtener información sobre cómo preparar e inyectar una dosis de ZILBRYSQ y cómo desechar correctamente las jeringas precargadas de ZILBRYSQ que ya utilizó.

ZILBRYSQ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con una enfermedad denominada miastenia grave generalizada (MGg) que presentan anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (AChR). Se desconoce si ZILBRYSQ es seguro y efectivo en niños.

Consulte la información completa de prescripción y la guía del medicamento de ZILBRYSQ, incluido el recuadro de advertencia relativo a las infecciones meningocócicas graves. Consulte las instrucciones de uso de la jeringa precargada de dosis única de ZILBRYSQ. Hable con su proveedor de atención médica sobre su afección o su tratamiento. Para obtener más información, visite www.ZILBRYSQ.com o llame al 1-844-599-2273.